

נספח 1. ניתוח שונויות דו-גורמי לבחינת השפעת אתר הדגימה (רמות מנשה וחוף השרון) ועונת הדגימה (קיץ וחורף) על השפע, המספר והעושר של הקרציות, אחוז הקרציות הנקבות ואחוז הפרטים ממין הקרצית הדומיננטי, שנדגמו על תנים ועל חזירי בר בתקופת המחקר

כוכביות מייצגות מובהקות: $P \leq 0.05$, * $P \leq 0.005$, ** ns – לא מובהק.

מין בעל החיים							
חזיר בר			תן זהוב				
P	F	df	P	F	df	פקטור	
ns	0.61	1	ns	0.82	1	שפע (כמות הקרציות שנדגמו על בעלי החיים)	
ns	2.37	1	**	8.89	1		אתר
ns	0.13	1	ns	0.54	1		אתר × עונה
ns	0.55	1	ns	0.03	1	עושר (מספר מיני הקרציות שנדגמו על בעלי החיים)	
ns	2.11	1	ns	2.05	1		אתר
ns	0.03	1	ns	0.39	1		אתר × עונה
*	3.87	1	ns	0.01	1	% קרציות נקבות (שנדגמו על בעלי החיים)	
*	5.48	1	**	10.5	1		אתר
*	5.22	1	ns	140.	1		אתר × עונה
*	4.01	1	ns	0.05	1	מספר קרציות נקבות (שנדגמו על בעלי החיים)	
*	7.45	1	ns	0.12	1		אתר
ns	1.64	1	ns	1.41	1		אתר × עונה
ns	2.56	1	ns	30.9	1	% הפרטים מהמין הדומיננטי (שנדגמו על בעלי החיים)	
*	7.64	1	**	8.98	1		אתר
ns	0.29	1	ns	1.23	1		אתר × עונה