



מרעה בקר בתוך יער אלונים, סמוך לשמורת אלוני אבא, הנחצה על-ידי גדר בקר. ינואר 2017 | צילום: אירית ק' אברמוביץ

לכאורה, רעיית עדרים בחורש וביער מספקת פתרון למספר בעיות: מרעה עונתי מספק מזון מגוון לעדרים וחוסך עלויות האבסה לבעלי העדרים; רעייה מקטינה את סכנת השרפות; רעייה במינון מתאים מעשירה את המגוון הביולוגי ביער ואף מעודדת את פריחת הכלניות בו.

אך מה קורה כאשר המינון או התזמון אינם מתאימים?

אברמוביץ, תושבת הסוללים (הסמוך לצומת המוביל), מעידה כי במשך שנים הוכנסו עדרי הפרות למרעה ביערות האלונים סביב היישוב בסביבות חודש אפריל. בשנים האחרונות החלה תקופת המרעה כבר בתחילת החורף, ובשנים אלו ניכרת ירידה דרמטית בכמות הכלניות, הצבעונים ופרחי חורף נוספים. לעומת זאת, משטחי הגדילנים והחרדלים התרבו מאוד. בעקבות פנייתה לקק"ל ייעשה מאמץ ב-2019 למנוע את כניסת העדרים לשטחים הללו לפני תחילת אפריל. אברמוביץ מקווה שכך יחזור המגוון הטבעי של היער לימיו המרהיבים.